



DiaPaste · DiaPro PLUS · DiaFiber

MAVE • TARM



FODERTILSKUD TIL HUNDE OG KATTE

DiaPaste



DiaPaste er et fodertilskud til hunde og katte, der kan anvendes ved forstyrrelser i mave-tarm-systemet som f.eks. løs mave.

DiaPaste indeholder lermineralet bentonit, som beskytter tarmslimhinden og giver tarmindeholdet form og fasthed, dextrose, som tilfører dyret energi, elektrolytter, som kan erstatte tab heraf, præbiotika (MOS) og betaglucan, som understøtter væksten af gode bakterier og tarmens immunsystem, samt aminosyren glutamin, der er en vigtig energikilde for tarmens celler.*

DiaPaste indgives i dyrets mund to til tre gange dagligt i tre dage eller som anbefalet af dyrlægen. **DiaPaste** kan også iblandes dyrets foder.

DiaPro PLUS



DiaPro PLUS er et præ- og probiotika fodertilskud til hunde og katte.

DiaPro PLUS indeholder de godkendte** probiotiske bakteriestammer *Enterococcus faecium* og *Lactobacillus acidophilus*.

DiaPro PLUS indeholder også præbiotika, de såkaldte MOS fibre som understøtter væksten af gode bakterier, samt betaglucan der understøtter tarmens immunsystem. Sammensætningen af både præ- og probiotika reducerer varigheden af løs mave, styrker immunforsvaret samt genopretter, stabiliserer og vedligeholder den naturlige mave-tarmflora, så din hund eller kat hurtigt opnår balance i mave-tarmsystemet.

DiaPro PLUS kan tildeles alene eller tilsættes dyrets foder eller vand. Tildes gerne i 10 til 15 dage efter dyret har opnået normal mave-tarmfunktion eller efter dyrlægens anvisning. Anvendes **DiaPro PLUS** sideløbende med **DiaPaste**, anbefales det at tildele **DiaPro PLUS** 2 timer før eller efter **DiaPaste**.



DiaPro



DiaPro er et probiotika fodertilskud til hunde og katte.

DiaPro indeholder den godkendte** probiotiske bakteriestamme *Enterococcus faecium*, som kan medvirke til at genoprette, stabilisere og vedligeholde den naturlige mave-tarmflora og reducere varigheden af løs mave.

DiaPro kapslerne kan tildeles hele som en godbid eller i dyrets foder. Kapslerne kan også åbnes og indholdet drysses ud over dyrets foder. Tildeles gerne i 10 til 15 dage efter dyret har opnået normal mave-tarmfunktion eller efter dyrlægens anvisning. Anvendes **DiaPro** kapslerne sideløbende med **DiaPaste**, anbefales det at tildele **DiaPro** kapslerne 2 timer før eller efter **DiaPaste**.



DiaFiber

DiaFiber er et velmagende fiber-fodertilskud til hunde og katte med ubalance i mave-tarmsystemet.

DiaFiber indeholder havre- og loppefrøskalsfibre, lermineral, præ- og probiotika, betaglukaner, L-glutamin, nukleotider og elektrolytter.

DiaFibers komplekse sammensætning understøtter dyrets mave-tarmfunktion og immunforsvar og medvirker til at stabilisere tarmfloraen og dermed mave-tarmsystemets samlede balance.

Anvendelse: Den anbefalede mængde **DiaFiber** blandes i foderet en gang dagligt eller efter dyrlægens anvisning. **DiaFiber** kan anvendes i en kortere eller længere periode (3-12 uger) indtil forstyrrelserne i mave-tarmsystemet er ophørt.

Det anbefales at konsultere dyrlægen inden anvendelse af **DiaFiber** og inden tildelingsperioden evt. forlænges.



VELSMAGENDE FODERTILSKUD TIL HUNDE OG KATTE

DiaPaste

15 ml sprøjte
30 ml sprøjte
60 ml sprøjte



Sammensætning pr. ml

Glycerin, dextrose, melasse 50 mg, gær og dele heraf (ølgær) 50 mg, natriumklorid, karamelliseret sukker, kaliumklorid, magnesiumklorid, hydrolyseret animalsk protein, konserveringsmidler.

Tilsætningsstoffer mg/g

1g 1m558i bentonit 400 mg
3c_3c451 L-glutamin 2 mg

TILDELING HUND OG KAT:

Vægt:	Dosering:
0-5 kg	2 ml to gange dagligt
5-15 kg	3 ml to gange dagligt
15-30 kg	5 ml to gange dagligt
Over 30 kg	7 ml to gange dagligt

DiaPaste anvendes indtil form og fasthed af dyrets afføring igen er normal (oftest 1-3 dage) eller efter dyrlægens anvisning.

DiaPro PLUS

20 breve á 5 gram



Sammensætning

Dextrose, gær og dele heraf (MOS, beta-1,3/1,6-D-glucan), hydrolyseret animalsk protein.

Tilsætningsstoffer pr. gram

Tarmflora stabilisator: 4b1707
Enterococcus Faecium DSM 10663/
NCIMB 10415 3.5×10^{10} CFU/g, 14 mg
4b1715 Lactobacillus Acidophilus D2/
CSL CECT 4529 1.5×10^{10} CFU, 20 mg.

TILDELING HUND OG KAT:

Vægt:	Dosering pr. dag:
Under 20 kg	½ brev
Over 20 kg	1 brev

DiaPro PLUS kan med fordel anvendes i kombination med **DiaPaste**. **DiaPro PLUS** bør gives mindst 2 timer før eller efter **DiaPaste**.

DiaPro

10×10 kapsler



Sammensætning

Laktose, siliciumdioxid, magnesiumstearat, hydrolyseret animalsk protein, gelatine-kapsler.

Tilsætningsstoffer pr. gram

Tarmflorastabilisator: 4b1707
Enterococcus faecium DSM 10663/NCIMB 10415 3.5×10^{10} CFU/g, 588,23 mg.

TILDELING HUND OG KAT:

Vægt	Dosering pr. dag
0-20 kg	1 kapsel
Over 20 kg	2 kapsler

DiaPro kapsler kan med fordel anvendes i kombination med **DiaPaste**.

DiaPro kapslerne bør gives mindst 2 timer før eller efter **DiaPaste**. Kapslerne kan åbnes og indholdet kan blandes i foderet.

DiaFiber

225 gram



Sammensætning pr. gram

Havrekliid 444,4 mg, maltodextrin, gær og dele heraf (MOS (præbiotika) 13,89 mg, beta-1,3/1,6-D-glucan 13,89 mg), hydrolyseret animalsk protein, loppefrøskaller (psyllium) 27,78 mg, magnesiumstearat, nucleotider 16,67 mg, natriumklorid og kaliumklorid.

Tilsætningsstoffer pr. gram

4b1707 E. faecium DSM 10663/NCIMB 10415 3.5×10^{10} CFU/g, 1,67 mg, 1m558i bentonit 55,5 mg, E551a silica (kiseltsyre) 30 mg, 3c451 L-glutamin 3,33 mg, 3b603 zinc oxid 3,33 mg, 3b107 jern (II) amino syrechelat 3,33 mg, 3b812 selenomethionin 3,33 mg, 2b17034 glycin 3,33 mg.

TILDELING HUND OG KAT:

Vægt	Antal skeer pr. dag:
Under 10 kg	½
10-20 kg	1
20-30 kg	1½
30-40 kg	2
Over 40 kg	3

Anvendelse

Den anbefalede mængde **DiaFiber** blandes i foderet en gang dagligt eller efter dyrlægens anvisning. Vedlagte måleske (15 ml) indeholder 7,5 g **DiaFiber**.

DiaFiber kan anvendes i kortere eller længere tid efter dyrlægens anbefaling.

REFERENCER:

- Gonzalez R, de Medina FS, Martinez-Augustin O et al: Anti-inflammatory effect of dioxmectin in hapten-induced colitis in the rat. Br J Pharmacol, 2004; 141: 951-60. • Halas, V., and I. Nocht. Mannan oligosaccharides in nursery pig nutrition and their potential mode of action. Animals 2012; 2:261-274.
- Yalcin SS, Yurdakök K, Tezcan I, Öner L, Öner L. Effect of glutamine supplementation on diarrhea, interleukin-8 and secretory immunoglobulin A in children with acute diarrhea. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2004; 38:494-501. • Benyacoub J, Czarnecki-Maulden GL, Cavadini C, Sauthier J, Anderson RE, Schiffrin EJ et al. Supplementation of food with Enterococcus faecium (SF68) stimulates immune functions in young dogs. J. Nutr. 2003; 133, 1158-1162. • Varankovich NV, Nickerson MT, Korber DR. Probiotic-based strategies for therapeutic and prophylactic use against multiple gastrointestinal diseases. Front Microbiol. 2015 Jul 14; 6:685.

• Godkendt som tarmflora stabilisator af EFSA – Den Europæiske Fødevarerikkerheds autoritet