

Sammensætning

Sorbitol, hydrolyseret animalsk protein, glycerin, hydrolyseret fiskeprotein, kasein og postbiotika.

Tilsætningsstoffer pr. ml

Aromastoffer:

2b Camellia sinensis 0,085 mg

Vitaminer og provitaminer:

3a300 Ascorbinsyre (Vitamin C) 2,00 mg

3a315 Niacinamide (Vitamin B3) 0,60 mg

3a820 Vitamin B1 0,12 mg

3a831 Vitamin B6 0,01 mg

Aminosyrer, deres salte og analoger:

3c440 L-Tryptophan 18,76 mg

Analyse

Råprotein 6,50 %, råfibre < 0,4 %, Total fedt < 0,5 %, aske 1,5 %, vand 47,7 %

Opbevaring

Fodertilskud til dyr. Ikke til konsum.

Opbevares tørt ved 4-25 grader, beskyttet mod sollys og utilgængeligt for børn.

ABP godkendelsesnummer: D41

Fremstillere: CF Pharma Ltd., Kilkenny, Ireland, EU No. cIEKK243133

Importør: Scanvet Animal Health, Kongevejen 66, 3480 Fredensborg, Danmark, www.scanvet.dk

Holdbarhed efter åbning:
3 måneder.

Anv. før:
Batch nr.:

Indhold: 100 ml




5



Relaxo

KAT

LACTIUM® & POSTBIOTIKA



100 ml

ScanVet

Relaxo KAT er et fodertilskud til katte.

Relaxo KAT indeholder essentielle aminosyrer (L-tryptophan), marine peptider (Peptidyss®), mælkepeptider (Lactium®), grøn te (Camellia sinensis), postbiotika og B-vitaminer.

Relaxo KAT anvendes til katte, der i forskellige situationer bliver utrygge, urolige, nervøse eller bange. Disse situationer kan f.eks. udløses af torden, fyrværkeri, transport, adskillelse fra ejer, pensionsophold eller ved dyrlægebesøg.

Relaxo KAT kan anvendes til alle katte uanset race og alder. Relaxo KAT er velsmagende og kan gives i foderet eller direkte i kattens mund.

DAGLIG TILDELING:

1 pumpe­slag giver 2,2 ml.

Vægt: Tildeling

0-4 kg 1 pumpe­slag

Over 4 kg 2 pumpe­slag

Omrystes
for brug

Efter 3-4 uger kan tildelingen nedsættes til ca. det halve, passende til det enkelte dyrs behov.

Relaxo KAT kan anvendes dagligt eller ved særlige begivenheder, som katten erfaringsmæssigt reagerer på. Bor tildes 1-2 timer før den udfordrende begivenhed finder sted. Anvendes Relaxo KAT over en længere periode, kan tildelingen efter 3-4 uger nedsættes til ca. det halve, passende til det enkelte dyrs behov. Ved behov kan tildelingen lejlighedsvis igen øges til vejledende tildeling.